



# Кетостерил® Новая упаковка

Новый взгляд на оригинальный препарат

Компания «Фрезениус Каби» всегда идет в ногу со временем, создавая современный дизайн для своих препаратов.

Представляем Вашему вниманию обновленную упаковку Кетостерил®. Кетостерил® после десятилетий успешного применения по-прежнему пользуется доверием специалистов здравоохранения во всем мире как оригинальный препарат кетоаналогов незаменимых аминокислот, помогающий в безопасном и эффективном лечении пациентов с ХБП.



# Кетостерил® – новая упаковка



Пиктограмма с изображением почек, указывающая на показания к применению



Контрастное изображение для облегчения чтения



Современный оригинальный дизайн



Стандартизированная упаковка для всех стран мира



В течение переходного периода внедрения будут одновременно доступны упаковки в новом и предшествующем дизайне. Содержимое упаковки и качество препарата останутся неизменными.

## Краткая инструкция по применению препарата

**Состав:** 1 таблетка содержит: **действующие вещества:** изолейцина альфа-кетоаналог (DL-метил-оксо-2-кальций валеринат) – 67 мг; лейцина альфа-кетоаналог (метил-4-оксо-2-кальций валеринат) – 101 мг; фенилаланина альфа-кетоаналог (оксо-2-фенил-3-кальций пропионат) – 68 мг; валина альфа-кетоаналог (метил-оксо-2-кальций бутират) – 86 мг; метионина альфа-гидроксиданалог (DL-гидрокси-2-кальций метилбутират) – 59 мг; L-лизина моноацетат – 105 мг; L-треонин – 53 мг; L-триптофан – 23 мг; L-гистидин – 38 мг; L-тирозин – 30 мг. **Вспомогательные вещества:** крахмал кукурузный – 44,0 мг; повидон – 6,0 мг; тальк – 19,57 мг; кремния диоксид коллоидный – 4,4 мг; магния стеарат – 15,0 мг; макрогол 6000 – 12,8 мг; повидон растворимый – 43,2 мг. **Оболочка таблетки:** тальк – 9,10 мг; макрогол 6000 – 1,48 мг; хинолиновый желтый (E104) – 0,72 мг; метилметакрилата, диметиламиноэтилметакрилата и бутилметакрилата сополимер (эурагит E 12,5) – 5,9 мг; триацетин – 0,43 мг; титана диоксид – 7,4 мг. **Общее содержание азота в таблетке** – 36 мг. **Содержание кальция в таблетке** 1,25 ммоль = 50 мг. **Показания к применению:** белково-энергетическая недостаточность, профилактика и лечение нарушений у взрослых и детей от 3 лет, вызванных измененным белковым метаболизмом при хронической почечной недостаточности, и при ограничении белка в рационе. В основном применяется у пациентов с хронической почечной недостаточностью со скоростью клубочковой фильтрации ниже 25 мл/мин, что не исключает применения при скорости клубочковой фильтрации и выше 25 мл/мин. **Противопоказания:** гиперкальциемия, нарушение обмена аминокислот, гиперчувствительность. При наследственной фенилкетонурии следует учитывать, что препарат содержит фенилаланин. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** недостаточно клинических данных о применении препарата у беременных женщин. В доклинических исследованиях прямого или косвенного вреда для течения беременности, эмбрио-фетального развития, родов и постнатального развития не обнаружено. При беременности препарат следует применять с осторожностью. Опыт применения в период грудного вскармливания отсутствует. При необходимости приема препарата в период кормления грудью следует учитывать соотношение риск/польза. **Способ применения и дозы:** для приема внутрь. Взрослым и детям от 3 лет по 1 таблетке на 5 кг массы тела в сутки или 0,1 г/кг массы тела в сутки. Если не предписано иначе, принимают 3 раза в день во время еды. Проглатывают, не разжевывая. **Длительность применения:** Кетостерил® назначают в течение всего периода, когда скорость клубочковой фильтрации ниже 25 мл/мин. В предиализный период рекомендуется содержание в пище белка не более 40 г в день в зависимости от степени хронической почечной недостаточности. У больных на диализе потребление белка должно быть согласно принятым стандартам. Обычная доза для взрослого (масса тела 70 кг) составляет 4-8 таблеток 3 раза в день. Обычная доза для детей - по 1 таблетке на 5 кг массы тела в сутки. Рекомендуемое содержание белка в пище для детей от 3 до 10 лет – 1,4-0,8 г/кг массы тела в сутки, для детей от 10 лет – 1,0-0,6 г/кг массы тела в сутки. **Побочное действие:** в отдельных случаях может развиваться гиперкальциемия. При этом рекомендуется снизить прием витамина D. Если гиперкальциемия сохраняется, уменьшить дозу Кетостерила®, а также других источников кальция. В отдельных случаях возможно возникновение аллергических реакций у пациентов с гиперчувствительностью к компонентам препарата. **Особые указания:** Кетостерил® следует принимать во время еды для его лучшего всасывания и превращения в соответствующие аминокислоты. Необходимо регулярно следить за уровнем кальция в сыворотке крови. Требуется обеспечить достаточную калорийность пищи. При одновременном применении с алюминия гидроксидом необходимо контролировать сывороточную концентрацию фосфатов (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами»). В случае если происходит нарастание сывороточной концентрации кальция, повышается чувствительность к сердечным гликозидам, а, следовательно, и риск аритмий. **Форма выпуска:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По 20 таблеток в блистер Al/PBX. По 5 блистеров в запаянный пакет из Al/PBX. 1 пакет в пачку картонную с инструкцией по применению. **Условия хранения:** хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. **Срок годности:** 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. **Условия отпуска:** отпускают по рецепту.



**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

ООО «Фрезениус Каби»  
125167, Москва, Ленинградский пр-т, г. 37, к. 9  
Т.: (495) 988-4578, Ф.: (495) 988-4579  
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com  
www.fresenius-kabi.ru

Представленный материал предназначен исключительно для Специалистов Здравоохранения, не может использоваться иными лицами, в том числе для замены консультации с врачом и для принятия решения о применении указанной в материале Продукции Компании. Продукция, указанная в данном материале, является лекарственным средством, имеет противопоказания к применению и использованию. Перед употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.