

Fresubin®

2 KCAL HP / 2 KCAL HP FIBRE

Klar til bruk i 500 ml EasyBag med dryppfri port



Næringsinformasjon

Næringsinnhold	Fresubin 2 KCAL HP		Fresubin 2 KCAL HP FIBRE	
		per 100 ml	per 100 ml	per 100 ml
Energi	kJ (kcal)	838 (200)	836 (200)	
Fett	g	10	10	
hvorav mettede fettsyrer	g	3,1	3,1	
MCT***	g	2,6	2,6	
hvorav enumettede fettsyrer	g	5,3	5,3	
hvorav flerumettede fettsyrer	g	1,6	1,6	
hvorav EPA* + DHA**	g	0,07	0,07	
Karbohydrater	g	18	17	
hvorav sukkerarter	g	2,7	2,7	
hvorav laktose	g	≤ 0,50	≤ 0,50	
Fiber	g	0	1,5	
Protein	g	10	10	
Salt	g	0,15	0,15	
Vitaminer				
Vitamin A	µg RE°	185	185	
hvorav β-karoten	µg RE°	45,0	45,0	
Vitamin D ₃	µg	2,0	2,0	
Vitamin E	mg α-TE ^{oo}	2,7	2,7	
Vitamin K	µg	13	13	
Vitamin C	mg	13	13	
Tiamin	mg	0,27	0,27	
Riboflavin	mg	0,35	0,35	
Niacin	mg/mg NE ^{ooo}	3,2/5,4	3,2/5,4	
Vitamin B ₆	mg	0,32	0,32	
Folsyre	µg	53,3	53,3	
Vitamin B ₁₂	µg	0,53	0,53	
Biotin	µg	10	10	
Pantotensyre	mg	0,93	0,93	
Mineraler og sporelementer				
Natrium	mg	60,0	60,0	
Kalium	mg	170	170	
Klor	mg	90,0	90,0	
Kalsium	mg	205	205	
Fosfor	mg	120	120	
Magnesium	mg	20,0	20,0	
Jern	mg	2,7	2,7	
Sink	mg	2,4	2,4	
Kobber	mg	0,27	0,27	
Mangan	mg	0,53	0,53	
Fluor	mg	0,27	0,27	
Selen	µg	13	13	
Krom	µg	13	13	
Molybden	µg	20	20	
Jod	µg	26,7	26,7	
Osmolaritet	mosmol/l	420	420	
Vann	ml	69	68	
Energiprosentfordeling (E%):				
Fresubin 2 KCAL HP: Fett 45, karbohydrater 35, fiber 0, protein 20				
Fresubin 2 KCAL HP FIBRE: Fett 45, karbohydrater 33, fiber 2, protein 20				
*eikosapentaensyre (EPA), **dokosaheksaensyre (DHA), ***triglyserider av middels kjedelengde (MCT), °retinolekvivalenter (RE), °°alfatokoferolekvivalenter (α-TE), °°° niacinekvivalenter (NE)				

Forskrivningsinformasjon

Næringsmiddel til spesielle medisinske formål.

Ernæringsmessig komplett energikonsentrert (2.0 kcal/ml), proteinrik (20 E%) sondeledøsning, uten fiber (Fresubin 2 KCAL HP) og med fiber (Fresubin 2 KCAL HP FIBRE). Med høy andel enumettede fettsyrer. Med MCT. Med fiskeolje. Lavt innhold av natrium. Laktoseredusert. Glutenfri. Til ernæringsbehandling av pasienter med eller i risiko for sykdomsrelatert underernæring, spesielt ved høyt protein- og energibehov og/eller væskerestriksjon.

Dosering:

Skal bestemmes av helsepersonell i henhold til pasientens behov. Anbefalt dosering for fullverdig ernæring er ≥ 1000 ml (2000 kcal) per dag.

Viktig informasjon:

Skal benyttes under medisinsk tilsyn. Koaguleringsmiddel i tarmtrakt, for eksempel pga. legemiddelinteraksjon, kan forekomme. Tilførselshastigheten må overvåkes. Egnert som eneste næringskilde. Ikke egnet til barn < 3 år. Benyttes med forsiktighet til barn < 6 år. Ikke egnet til pasienter med galaktosemi. Sørg for tilstrekkelig væske- og elektrolyttinntak. **Ikke til parenteral (I.V.) bruk!**

Lagring og håndtering:

Lagres ved romtemperatur. Åpnet pakning anvendes innen 24 timer. Ristes godt før bruk! Skal ikke benyttes dersom posen er skadet, oppsvulmet eller innholdet er klumpet. Skal ikke blandes med legemidler. Anbefalt sondestørrelse: ≥ CH 5 for pumpeassistert administrering, ≥ CH 12 for gravitasjonsadministrering.

Kontraindikasjoner:

Ikke egnet ved tilstander hvor enteral ernæring er kontraindisert, som f.eks ved akutt gastrointestinal blødning, ileus og sjokk. Benyttes med forsiktighet ved alvorlig organsvikt med forstyrret metabolisme og alvorlige former for nedsatt fordøyelse og absorpsjon. Ikke egnet ved medfødt manglende evne til å metabolisere noen av næringsstoffene i Fresubin 2 KCAL HP eller Fresubin 2 KCAL HP FIBRE.

Flerkulturell egnethet:

Fresubin 2 KCAL HP og Fresubin 2 KCAL HP FIBRE er halal- og koshercertifisert. Sertifikat kan fremvises på forespørsel.

Ingredienser

Ingredienser (Fresubin 2 KCAL HP): Vann, glukosesirup, spiselig kalsiumkaseinat (fra melk), melkeprotein, vegetabiliske oljer (rapsoelje, solsikkeolje), triglyserider av middels kjedelengde (MCT), maltodekstrin, kaliumsitrat, fiskeolje, emulgatorer (soyalecithiner, E 471), surhetsregulerende middel (E 507), kaliumkarbonat, natriumklorid, vitamin C, natriumkarbonat, magnesiumoksid, jernsulfat, sinkulfat, niacin, manganklorid, pantotensyre, kobbersulfat, natriumfluorid, vitamin B₂, vitamin B₆, vitamin B₁, vitamin A, β-karoten, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, natriumselenitt, kaliumjodid, vitamin K₁, biotin, vitamin D₃, vitamin B₁₂.

Ingredienser (Fresubin 2 KCAL HP FIBRE): Vann, glukosesirup, vegetabiliske oljer (rapsoelje, solsikkeolje), spiselig kalsiumkaseinat (fra melk), melkeprotein, triglyserider av middels kjedelengde (MCT), inulin, maltodekstrin, cellulosefiber, hvitedekstrin, kaliumsitrat, fiskeolje, emulgatorer (soyalecithiner, E 471), surhetsregulerende middel (E 507), kaliumkarbonat, natriumklorid, vitamin C, natriumkarbonat, magnesiumoksid, jernsulfat, sinkulfat, niacin, manganklorid, pantotensyre, kobbersulfat, natriumfluorid, vitamin B₂, vitamin B₆, vitamin B₁, vitamin A, β-karoten, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, natriumselenitt, kaliumjodid, vitamin K₁, biotin, vitamin D₃, vitamin B₁₂.

Kjente FODMAPs per 100 ml

Laktose: ≤ 0,50
Fruktose: 0,03* g
Inulin: 0,67* g

* Gjelder kun Fresubin 2 KCAL HP FIBRE

- McGregor RA, Poppitt SD. Milk protein for improved metabolic health: a review of the evidence. *Nutr Metab (Lond)* 2013;10(1):46.
- Lochs H, Allison SP, Meier R, Pirlich M, Kondrup J, Schneider S, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: terminology, definitions and general topics. *Clin Nutr* 2006;25:180-6.