

Paracetamol Fresenius Kabi

10 mg/ml infusionsvätska, lösning

Risk för överdosering hos nyfödda, spädbarn samt underviktiga vuxna vid behandling med intravenös paracetamol på grund av felaktig administrering

Paracetamol Fresenius Kabi är indicerat för korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter kirurgi, korttidsbehandling av feber, när intravenös tillförsel är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller hypertermi, och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga.¹

DOSERING BEROR PÅ PATIENTENS VIKT. DEN ADMINISTRERADE VOLYMEN KAN VARA MYCKET LITEN.

Dosering baserad på patientens vikt¹

	Patientens vikt ≤ 10 kg	Patientens vikt > 10 kg – ≤ 50 kg
Till operationssal	7,5 mg/kg dvs. 0,75 ml/kg	15 mg/kg dvs. 1,5 ml/kg
↓ minimum intervall 4 timmar	7,5 mg/kg	15 mg/kg
	Inte mer än 4 doser av 7,5 mg/kg paracetamol utan att överskrida 30 mg/kg/dygn	1 IV-infusion av 15 mg/kg/ 4–6 timmar utan att överskrida 60 mg/kg/dygn

(Dosering uttryckt i mg paracetamol per kg kroppsvikt)

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml, 50 ml 1 ml = 10 mg

För nyfödda, spädbarn och barn som väger upp till 33 kg¹

- Nyfödda, spädbarn och barn som väger upp till 10 kg: 7,5 mg/kg, dvs. 0,75 ml/kg per administration, upp till 4 gånger per dygn.
- Barn som väger mer än 10 kg och upp till 33 kg: 15 mg/kg, dvs. 1,5 ml/kg per administration, upp till 4 gånger per dygn.

Exempel på dosering

Barnets vikt	Volym att administrera
2 kg	1,5 ml
2,5 kg	1,8 ml
3 kg	2,25 ml

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml, 100 ml 1 ml = 10 mg

För vuxna, ungdomar och barn som väger mer än 33 kg¹



- Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg: se produktinformation
- Barn som väger mer än 33 kg, ungdomar och vuxna som väger upp till 50 kg: 15 mg/ml, dvs. 1,5 ml/kg per administration, upp till 4 gånger per dygn.

- För barn med låg vikt, kan Paracetamol Fresenius Kabi spädas ut i 0,9 % natriumklorid eller en 5 %-ig glukoslösning upp till en tiondel.
- För att undvika risken för överdos, kontrollera att andra mediciner som administreras inte innehåller paracetamol eller propacetamolhydroklorid.
- Vid överdos, överväg följande (för detaljerad procedur hänvisas till SPC och expert toxikolog): sjukhusvistelse, symptomatisk behandling, administration av N-acetylcystein (motgift), blodprov (test av leverfunktion, plasma paracetamol-analys). Effekterna av hemodialys är begränsade. Allvarliga fall kan kräva levertransplantation.



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

¹Summering av produkttegenskaper för Paracetamol Fresenius Kabi