

Fresubin ORIGINAL FIBRE



Nährwertdeklaration

Durchschnittlicher Gehalt		100 ml
Energie	kcal	100
	(kJ)	(420)
Fett (30 Energie%)	g	3,3
davon gesättigte Fettsäuren	g	0,3
davon einfach ungesättigte Fettsäuren	g	2,2
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	0,8
davon EPA* + DHA**	g	0,03
Kohlenhydrate (52 Energie%)	g	13
davon Zucker	g	0,9
davon Laktose	g	≤ 0,03
Ballaststoffe (3 Energie%)	g	1,5
Eiweiß (15 Energie%)	g	3,8
Salz (Na x 2,5)	g	0,33
Wasser	ml	84
Osmolarität	mosmol/l	285
Mineralstoffe und Spurenelemente		
Natrium	mg	133
Chlorid	mg	153
Kalium	mg	155
Calcium	mg	80
Phosphor	mg	63
Magnesium	mg	25
Eisen	mg	1,3
Zink	mg	1,2
Kupfer	mg	0,13
Jod	µg	13,3
Selen	µg	6,7
Mangan	mg	0,27
Chrom	µg	6,7
Molybdän	µg	10
Fluorid	mg	0,13
Vitamine und andere Stoffe*		
Vitamin A	µg RE°	92
davon Beta-Carotin	µg RE°	22
Vitamin D	µg	1,3
Vitamin E	mg α-TE°°	1,3
Vitamin K	µg	6,7
Vitamin C	mg	6,7
Vitamin B ₁	mg	0,13
Vitamin B ₂	mg	0,17
Vitamin B ₆	mg	0,16
Niacin	mg/mg NE°°°	1,6/2,4
Folsäure	µg	26,7
Vitamin B ₁₂	µg	0,27
Pantothensäure	mg	0,47
Biotin	µg	5
Cholin*	mg	36,7

*Eicosapentaensäure (EPA), **Docosahexaensäure (DHA)
° Retinoläquivalente, °° Alpha-Tocopherol-Äquivalente (°TE), °°° Niacin-Äquivalente (NE)

Hinweise für den Anwender

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät):

Zum Diätmanagement bei Patienten mit bestehender oder drohender Mangelernährung.

Dosierung/Empfohlene Tagesmenge:

Durch den behandelnden Arzt entsprechend der Bedürfnisse des Patienten festzulegen.

Zur ausschließlichen Ernährung: ≥ 1500 ml (1500 kcal)

Wichtige Hinweise:

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zufuhr rate kontrollieren. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten. **Nicht für die parenterale**

(i.v.) Anwendung!

Anwendungshinweise:

Empfohlener Sondendurchmesser: ≥ CH 8 bei pumpenassistierter Verabreichung (°), bei Schwerkraftapplikation ↓↓ ≥ CH 8. Bei Raumtemperatur lagern. Geöffnet innerhalb von 24 h aufbrauchen. Vor Gebrauch schütteln. Nicht verwenden bei beschädigtem/aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt. Nicht mit Arzneimitteln mischen.

Kontraindikationen:

Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen einen in Fresubin ORIGINAL FIBRE enthaltenen Inhaltsstoff. Nicht geeignet bei Galaktosämie. Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.

Zutaten

Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Natriumcaseinat (aus Milch), Sojaweiweiß, Inulin, Zellulose, Weizendextrin, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Emulgatoren (Sojalecithine, E 471), Kaliumphosphat, Fischöl, Stabilisatoren (E 460, E 466), Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Vitamin B₁, Vitamin B₂, Vitamin B₆, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B₁₂.

Bestellinformationen

Packungsgröße	Artikel-Nr.	PZN	Geschmack
EasyBag/15 x 500 ml	7047221	2589698	neutral
EasyBag/8 x 1000 ml	7052231	2247070	neutral