



Freka-Clyss®

Einmal-Klistiere auf Salzbasis

Gebrauchsfertig zur rektalen Anwendung

Einfache Handhabung

Eintritt der Defäkation innerhalb
weniger Minuten

Reduziertes Verletzungsrisiko

Freka-Clyss®

Gebrauchsfertig zur rektalen Anwendung



Anwendungsgebiete

Freka-Clyss® wird angewendet bei Verstopfung (Obstipation), zur raschen und nachhaltigen Entleerung des Enddarms vor Operationen, zur Vorbereitung von urologischen, röntgenologischen und gynäkologischen Untersuchungen oder Rektoskopien.

Freka-Clyss®



- Gebrauchsfertiger Beutel zum rektalen Einlauf
- 15 cm langer Einführungsschlauch gewährleistet ein hohes Eindringen der Flüssigkeit
- Vermeidung von Verletzungen der Darmschleimhaut durch den flexiblen Schlauch und abgerundeten Konus des Verschlussstückes
- Eintritt der Defäkation innerhalb weniger Minuten

100 ml enthalten:

Natriumdihydrogenphosphat 2 H ₂ O	16 g
Natriummonohydrogenphosphat 12 H ₂ O	6 g
p-Hydroxybenzoesäuremethylester	0,1 g
p-Hydroxybenzoesäurepropylester	0,01 g
Wasser für Injektionszwecke	

Hinweis: Freka-Clyss® darf nicht bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren angewendet werden. Die Anwendung bei Kindern kann zu schweren Komplikationen, auch mit tödlichem Ausgang führen, insbesondere sind dies Elektrolytstörungen, vor allem Hyperphosphatämie und Hypocalcämie sowie deren klinische Folgen wie Tetanie und Herzrhythmusstörungen.

Bestellinformationen

Freka-Clyss®

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Freka-Clyss® 120 ml KP**	1 x 10	Karton	1992081	06987361
Freka-Clyss® 120 ml EP***	10 x 1	Karton	1993081	06987378

* Verpackungseinheit ** Klinik-Packung *** Einzel-Packung